





STIMULATEUR CARDIAQUE | PATIENTS EN EXTERNE

Le stimulateur cardiaque (*pacemaker*) est un petit appareil placé sous la peau et relié au cœur par une sonde souple. Cet appareil sert à contrôler le rythme et les battements cardiaques en envoyant des impulsions électriques au cœur.



Stimulateur cardiaque



La durée du stimulateur cardiaque (*pacemaker*) est de 8 à 12 ans.

Le premier contrôle de la pile s'effectue 6 semaines après la pose du stimulateur cardiaque. Par la suite, le contrôle de la pile s'effectue aux 6 mois à 12 mois. Il est donc très important de respecter vos rendez-vous à la clinique du *pacemaker*.

À l'hôpital, vous recevrez une carte qui identifie votre stimulateur cardiaque. Vous recevrez par la poste la carte officielle de la compagnie. Il est conseillé de garder cette carte avec vous en tout temps.

ADMISSION

Un employé du Service d'hémodynamie de l'Hôpital Fleurimont communiquera avec vous afin de vous informer de la date, de l'heure et de l'endroit où vous devrez vous présenter.

Date et heure de mon admission :

* Si vous devez annuler ou reporter votre admission (rhume, grippe, fièvre, infection), avertissez le plus rapidement possible le Service d'hémodynamie au 819 346-1110, poste 14550.

LA VEILLE DE L'INTERVENTION

- Effectuez un rasage du côté gauche du thorax et lavez la zone rasée avec le savon désinfectant rouge remis lors de votre rencontre à la clinique du *pacemaker*.
- Demeurez à jeun d'eau et de nourriture à partir de minuit.

ARTICLES À APPORTER

- Carte d'assurance maladie
- Carte de l'hôpital (couleur aubergine)
- Pantoufles
- Articles de toilette (dentifrice, brosse à dents, savon, contenant à dentier et à verres de contact)
- La liste de vos médicaments à jour
- Vos médicaments dans leurs contenants d'origine

LE JOUR DE L'INTERVENTION

- Vous devez être à jeun d'eau et de nourriture depuis minuit.
- Des prises de sang pourraient être effectuées.
- Deux voies veineuses seront installées pour l'intervention.
- Vous devez enlever vos épingles à cheveux, vos prothèses dentaires, vos prothèses auditives, vos lunettes ou verres de contact, vos sous-vêtements et tous vos bijoux.
- Remettez vos bijoux, objets précieux, cartes de crédit et argent à un membre de votre famille afin d'éviter les pertes et les vols.

L'INTERVENTION

Le cardiologue électrophysiologiste, assisté par le technologue en radiologie, l'infirmière et le technicien en électrophysiologie, procède à l'intervention.

VOTRE SÉJOUR À L'HÔPITAL

- À moins d'une condition médicale spécifique, vous serez admis à la chirurgie d'un jour, au local 3536 de l'Hôpital Fleurimont.
- Vous devrez rester allongé durant quelques heures, selon les recommandations du médecin.
- Il est possible qu'un pansement qui exerce une pression soit installé à la hauteur du site de votre stimulateur cardiaque afin d'éviter les saignements.
- Le personnel infirmier contrôlera régulièrement vos signes vitaux et surveillera votre pansement.

VOTRE CONGÉ DE L'HÔPITAL

Lorsque vous obtiendrez votre congé de l'hôpital, vous pourrez retourner à la maison en voiture, comme passager. Votre accompagnateur devra porter vos bagages.

RECOMMANDATIONS

Soins de la plaie

Enlevez le pansement 48 heures après l'intervention et laissez votre plaie « à l'air libre ». Il est normal de voir quelques ecchymoses (coloration bleutée) au site opératoire. Si vous avez des diachylons de rapprochement sur la plaie, vous devez les enlever après 10 jours ou lorsqu'ils ne collent plus.

Hygiène

- Attendez 7 jours avant de prendre un bain ou de vous baigner (piscine, spa, lac, océan...).
- Vous pouvez prendre une douche dès que vous n'avez plus de pansement.

Médication

Assurez-vous de prendre la médication prescrite selon les recommandations du médecin.

Gestion de la douleur

Vous pouvez prendre de l'acétaminophène (Tylenol®) si vous ressentez de l'inconfort au site de l'intervention.

Retour au travail

Votre retour au travail sera déterminé selon les recommandations de votre médecin.

Efforts physiques

- Ne levez pas le bras (du côté opéré) au-dessus de l'épaule pour une période de 14 jours.
- Ne levez pas de poids (enfants, sacs d'épicerie, objets lourds, etc.) pour une période de 14 jours, mais recommencez à faire des exercices avec le bras dès le lendemain de l'intervention afin d'éviter qu'il ne s'engourdisse (ankylose) : rotation, flexion, extension.
- La reprise d'activités physiques et le retour à des sports de contact (football, baseball, etc.) se feront selon les recommandations de votre médecin.

Conduite automobile

La reprise de la conduite automobile se fera selon les recommandations de votre médecin.

Une évaluation médicale est souvent demandée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Les compagnies d'assurances ont des directives spécifiques concernant la conduite automobile après une intervention. Informez-vous auprès de votre compagnie.

Avion

Si vous devez prendre l'avion, présentez la carte d'identification de votre stimulateur cardiaque au bureau d'enregistrement afin d'éviter de passer à l'intérieur de l'appareil qui détecte les objets métalliques puisque cet appareil pourrait affecter temporairement votre stimulateur cardiaque.

Dentiste et médecin

Avertissez votre dentiste ou tout nouveau médecin que votre cœur fonctionne avec un stimulateur cardiaque.

Appareils domestiques

- Vous pouvez utiliser vos appareils domestiques (four à micro-ondes, tondeuse) ou de bureau (ordinateur) à condition de les maintenir en bon état.
- Certains types d'équipement avec un champ magnétique ou électrique (système antiviol, aimants puissants, soudure à l'arc, moteur en marche, appareil qui utilise du courant élevé, etc.) peuvent affecter temporairement votre stimulateur cardiaque. Gardez une distance de 30 cm (1 pied) de ces appareils. Si vous ressentez des symptômes comme des battements rapides et irréguliers ou un malaise, éloignez-vous de l'appareil.

Téléphone cellulaire

- Maintenez une distance minimum de 15 cm (6 pouces) entre le téléphone et le site du stimulateur cardiaque.
- Tenez le combiné du téléphone sur l'oreille opposée au site du stimulateur cardiaque.
- Portez votre téléphone dans une poche ou une ceinture du côté opposé au site du stimulateur cardiaque.

Traitements médicaux avec ondes

Consultez toujours votre médecin avant tout autre examen ou traitement (ex. : imagerie par résonance magnétique [IRM], radiothérapie, etc.), car certains d'entre eux sont déconseillés puisqu'ils pourraient nuire à votre stimulateur cardiaque.

SYMPTÔMES À SURVEILLER

Consultez si vous constatez les symptômes suivants :

- votre pouls est plus vite que 130 battements/minute après une période de repos;
- votre pouls est plus lent que _____ battements/minute;
- vous vous sentez étourdi ou vous perdez connaissance;
- vous notez un changement à votre plaie : rougeur, douleur, gonflement, chaleur ou écoulement;
- vous faites de la fièvre (38,5 °C ou 101 °F) ou vous avez de la difficulté à respirer;
- vous avez le hoquet ou des contractions musculaires spastiques de façon continue ou fréquente;
- vous avez des palpitations ou des douleurs derrière le sternum, au centre de la poitrine (rétrosternales).



Clinique du pacemaker
819 346-1110, poste 15103
Lundi au vendredi, 8 h à 16 h



Si la clinique est fermée,
appelez Info-Santé au 8-1-1.



Référez-vous à votre médecin de famille ou présentez-vous à l'urgence du centre hospitalier le plus proche.

Auteur

Équipe de la cardiologie de l'Hôpital Fleurimont

Révision et mise en page

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques