

Critères d'évaluation permettant d'établir le stade.

	Parodontite	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Sévérité	Perte d'attache (au site le plus sévère)	1-2 mm	3-4 mm	5 mm et +	5 mm et +
	% perte osseuse/ longueur racine	Tiers coronal ≤15%	Tiers coronal 15-33%	+ du tiers coronal > 33%	+ du tiers coronal > 33%
	Dents manquantes (raison de la parodontite)	Aucune		4 et moins	5 et plus
Complexité		- Poche paro ≤4 mm - Perte osseuse horizontale	- Poche paro ≤5 mm - Perte osseuse horizontale	Complexité Stade 2 + - Poche paro ≥6 mm - Furcation CI2/ CI3 - Défaut vertical 3 mm et + - Défauts modérés crête osseuse	Complexité Stade 3 + - Perte DVO - Migrations - TVO secondaire - Mobilité de degré 2 - Dysfonction masticatoire
Étendue	Descripteur additionnel du stade	De l'information sur l'étendue de la parodontite peut être ajoutée comme information additionnelle: forme localisée (<30% des sites affectés); forme généralisée (+ de 30% des sites affectés; forme molaire/incisive affectées seulement			

Critères d'évaluation du grade

	Progression		Grade A (lente)	Grade B (modérée)	Grade C (rapide)
Critère primaire	Évidence directe	Évaluation radiographique ou perte d'attache clinique	Aucun changement 5 ans	< 2 mm en 5 ans	≥ 2 mm en 5 ans
	Évidence indirecte	% perte osseuse/age	Moins de 0.25	De 0.25 à 1	Plus de 1
		Phénotype	Quantité de dépôts importante; perte de support limitée	Quantité de dépôts proportionnelle à la perte de support	Perte osseuse importante malgré la faible présence de dépôts
Modificateur de grade	Facteurs de risque	Tabagisme	Non fumeur	<10 cigs/jr	≥10 cigs/jr
		Diabète	Non diabétique	HbA1c: <7%	HbA1c: ≥7%